Příloha č. 1b **Determinační klíč velkých mlžů, kteří se vyskytují v České republice**

Lastury trojúhelníkovité, typický je chomáč byssových vláken, délka lastur do 30 mm → slávička mnohotvárná (*Dreissena polymorpha*)

Zámek je tvořen jen zuby bez lišt, lastury silnostěnné protáhlého tvaru a tmavé, oligotrofní toky → Perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)

Lastury mají zámek se základními zuby i lištami, protáhlý tvar, lastury tlustostěnné, velikost do 90 mm → Velevrubi (rod *Unio*)

Menší, zploštělé lastury, kosodélníkové, štít není křídlatě vytažený, délka do 80 mm → škeblička plochá (*Pseudanodonta complanata*)

Velké protažené lastury s nízkým zaobleným štítem, vrcholové lišty jsou rovnoběžné s přírůstovými liniemi, délka až 220 mm → škeble rybničná (*Anodonta cygnea*)

Menší, kratší lastury, výrazný a často křídlovitý štít, vrcholové lišty nejsou rovnoběžné s přírůstovými liniemi → škeble říční (*Anodonta anatina*)

Vysoké lastury téměř kruhovitého tvaru, lastury jsou relativně silnostěnné, na vnitřní straně nejsou přítomny žádné zámkové zuby, kupovitý vrchol s hrubými valy, periostrakum často s příměsí tmavě fialové barvy, vnitřní strana lastury má nápadně růžově zbarvenou perleť, délka až 250 mm → škeblice asijská (*Sinanodonta woodiana*)

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Program Beta
T A Č R